



こんな時どうする？



- 棟内で3名の感染性胃腸炎が出ており、
そのうちの一人、Aさんの介助について考える。

「あ〜」とAさんが呼ぶ声があるので部屋を見に行くと横なった状態で片手を上げて叫んでいました。上げている左手が便まみれになっており、床に便もついているが、床などに塗った様子なく服もはいたまま泥状便失禁していました。

※1名での対応時

職員が取った対応

- ①スリッパのまま入る
- ②「待つ」「動かない」など声掛け
- ③ガウンの上にガウンを着て、手袋の上に手袋
- ④ゴミ袋・次亜塩素酸・WCペーパー・オレンジタオル
- ⑤手の便をWCペーパーで拭く
- ⑥床の便はWCペーパーを置いて次亜塩素酸を掛けた
- ⑦足に便がついてないのを確認してトイレの大便器に誘導
- ⑧便器に座ってもらって、ゴミ袋を取りに行く
- ⑨衣服を脱いでもらう
- ⑩WCペーパーで便を拭いて都度トイレに流す
- ⑪オレンジタオルをお湯で濡らしてお尻・足など清拭
- ⑫洗面所で手洗い・顔も触ったので顔を拭く
- ⑬部屋の便をWCペーパーで取ってスザクとオレンジタオルで仕上げる
- ⑭次亜塩素酸をまく
- ⑮上に着ていたガウンと手袋を脱ぐ

グループディスカッション

- ①あなたなら、どんな対応をしますか
- ②こんなものがあつたらいいな
- ③普段からできることは？
※③まではできませんでした。



①あなたなら、どんな対応をしますか

1. 床の便は新聞やタオルをかけてからスザクをかける
2. お風呂に連れていき洗い流す
3. 部屋の清掃をする



1. 床の便にスザクをかけて飛沫を防ぐ
2. 本人が触りそうなものなど周りの物をかたずける
3. 本人を部屋できれいにする



1. 部屋で脱がして部屋でキレイにする
2. 本人をきれいにしてから、部屋の中を清掃する。



1. 人を呼ぶかな
2. 本人を部屋の入り口付近に立ってもらい部屋の清掃
3. 窓を開ける
4. 本人を大量のオレンジタオルできれいにする。



①あなたなら、どんな対応をしますか

- トイレやお風呂など別の場所に移動するよりは、部屋の中で完結した方が、他の感染リスクを減らせるのでは
- 人を呼んだ場合や2名の体制でも、部屋の中で対応する職員は1名で他の職員は後方支援(物品を持ってきたり)
- ガウンやプラスチックグローブを2枚着るのは良いのでは
- 対応したあとガウン・プラスチックグローブ・マスクの取り換え
- 本人がきれいになっても便失禁の後はシャワーをしてやりたい

基本的な対応など情報

- [感染症情報センター: ノロウイルス感染症とその対応・予防\(医療従事者・施設スタッフ用\) \(nih.go.jp\)](http://nih.go.jp)
- [ノロウイルスに要注意！感染経路と予防方法は？ | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン \(gov-online.go.jp\)](http://gov-online.go.jp)